ALGORYTM POSTĘPOWANIA Z OPATRUNKIEM BIOLOGICZNYM

INSTRUKCJA DLA OPIEKUNA/PACJENTA

Wdrożenie terapii biologicznej larwami *Lucilia sericata* ma za zadanie oczyszczenie i pobudzenie rany do gojenia. Czas utrzymania larw w ranie zazwyczaj nie przekracza **3** dni

LARWY DO RANY APLIKUJE PERSONEL MEDYCZNY. KONTROLA OPATRUNKU PO **24, 48** i **72** GODZINACH

PAMIĘTAJ! ABY TERAPIA BYŁA SKUTECZNA STOSUJ ZALECENIA PERSONELU PORADNI DOTYCZĄCE STOSOWANIA LEKÓW PRZECIBÓLOWYCH, ODCIĄŻANIA, KOMPRESJOTERAPII, REWIZJI OPATRUNKU

JEŚLI MASZ OBAWY DZWOŃ POD WSKAZANY NUMER W CELU INFORMACJI

1

Umuj ręce, przygotuj zestaw (nożyczki, pasta cynkowa, włóknina opatrunkowa, Vliwasoft,® NaCl 0,9%, podkład ochronny, plaster Hypafix,® Omnifix®)

Jałowym roztworem NaCl 0,9% dokonaj płukania rany w taki sposób aby larw nie ewakuować z rany

5

NIE STOSUJ ANTYSEPTYKÓW DO OCZYSZCZENIA RANY

2

Ułóż pacjenta w taki sposób aby mieć jak najlepszy dostęp do rany. Wyjaśnij cel swoich działań, podłóż podkład ochronny

Zabezpiecz skórę wokół rany pastą cynkową

6

PAMIĘTAJ, ŻE WYSIĘK I SPECYFICZNY ZAPACH SĄ REZULTATEM DZIAŁAŃ LARWY

3

Załóż rękawice ochronne. Delikatnie ściągnij opatrunek, pamiętaj że larwy są luzem i mogą być w opatrunku, który dotyka bezpośrednio rany

Zwilż NaCl 0,9% włókninę opatrunkową i nałóż na ranę, tak aby była cała zakryta opatrunkiem, nałóż dodatkową suchą warstwę

7

W PRZYPADKU NIETOLERANCJI METODY USUŃ LARWY PO KONSULTACJI

4

Sprawdź, czy w ranie są ruchliwe, żywe larwy w taki sposób aby nie dotykać łożyska rany

Zabezpiecz ranę z jałowym opatrunkiem plastrem Hypafix® lub Omnifix®, zdejmij rękawiczki

8

PAMIĘTAJ, ABY W PRZYPADKU RANY NA KOŃCZYNIE DOLNEJ STOSOWAĆ KOMPTRESJOTERAPIĘ WG ZALECEŃ PERSONELU

Szewczyk MT, Cwajda-Białasik J., Mościcka P., Cierzniakowska K., Bazaliński D., Jawień A., Spannbauer A., Polak A., Sopata M., Kozłowska E., Popow A., Jabłońska R., Przybek-Mita J., Sierżantowicz R., Kuberka I., Ślusarz R., Mrozikiewicz-Rakowska B., Kózka M., Jakubowska U., Bakowska M., Augusewicz Z., Samson I.: Leczenie odleżyn – zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Część II. Leczenie Ran 2020; 17: 151-184.