



Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

Przygotowanie pacjenta przed pobraniem krwi

- W okresie poprzedzającym badanie należy zachować dotychczasową, typową dietę bez ograniczeń.
- Na 48 godzin przed planowanym pobraniem krwi, należy unikać znacznego wysiłku fizycznego i spożywania alkoholu.
- Jeśli to możliwe, pobranie krwi powinno, odbyć się przed wdrożeniem leczenia. Pacjent, po uzgodnieniu z lekarzem, powinien ograniczyć przyjmowanie leków (z wyjątkiem leków koniecznych) lub wyłączyć leki mogące wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego oraz powstrzymać się od stosowania parafarmaceutyków. Pacjent powinien poinformować personel Laboratorium o stosowanych lekach.
- Do pobrania krwi należy zgłaszać się na czczo, po co najmniej 8 godzinnej przerwie posiłkowej, po lekkostrawnej kolacji. Dopuszcza się wypicie małej ilości wody (1/2 szklanki) wody przegotowanej. W przypadku zlecenia **profilu lipidowego** (cholesterol całkowity + cholesterol HDL + cholesterol LDL + trójglicerydów) wskazane jest zachowanie 12 godzinnej przerwy posiłkowej.
- Pobranie krwi powinno odbyć się po standardowym wypoczynku nocnym, między godz. **7:00 – 9:00 rano**, po co najmniej 15 min. odpoczynku w pozycji wygodnej dla pacjenta. Przed pobraniem krwi nie należy palić papierosów, ponieważ wpływa to na poziom wielu oznaczanych parametrów.
- Na 2 – 3 dni przed pobraniem krwi **w celu oznaczenia poziomu PSA** pacjent nie powinien poddawać się badaniu przez odbytnicemu bądź biopsji gruczołu krokowego, a ponadto powinien zachować wstrzemięźliwość seksualną oraz unikać intensywnej jazdy na rowerze.
- W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, gdyż nie wpływa istotnie na większość rutynowych badań. Wyjątkiem jest badanie glukozy, które wymaga bezwzględnego pozostania na czczo.