



Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza I: 000000010076
36-200 Brzozów KS. Józefa Bielawskiego 18
Tel./fax (13) 430 9525
REGON: 000304473 NIP: 6861441430



13 43 07 995 sekretariat Pracowni Endoskopii w godz. 10:00 -12:00

13 43 09 663 lub 508 347 282 pracownia endoskopii

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

W trosce o Państwa czas i spokój prosimy o zapoznanie się z formularzem zgody na kolonoskopię przed zaplanowanym terminem badania.

Treść dokumentu proszę odczytać w dowolnym momencie w domu po zeskanowaniu kodu QR:



↖ Zeskanuj mnie!

Jednocześnie informujemy, że przed wejściem do pracowni w dniu badania, należy zgłosić się 5 minut wcześniej przed planowaną godziną badania do sekretariatu pracowni z dowodem osobistym celem podpisania wymaganej zgody na badanie.

Bez dopełnienia tej formalności wejście do pracowni nie będzie możliwe.

TERMIN BADANIA:	Dieta	Zastosowanie leków przeczyszczających (dla pacjentów zaplanowanych do zabiegu na przedpołudnie)
<u>5 dni przed terminem badania</u> 	<u>Wprowadź dietę lekkostrawną ZREZYGNUJ ZE SPOŻYWANIA:</u> ○ Warzyw i owoców z pestkami, ○ Pieczywa z ziarnami, ○ Świeżych warzyw i owoców, ○ Smażonych potraw. Stosuj dietę bezreszkową, półpłynną np.: gotowane, duszone mięso, bulion warzywny, ryż, makaron, chudy ser, czyste soki bez miąższu, kisiel, galaretki.	<u>Osoby z zaparciami</u> – kupić (dostępny bez recepty) syrop LACTULOZA – pić 3x1 łyżka Pacjent powinien przejść na płynną, lekkostrawną dietę co najmniej 7 dni przez planowaną kolonoskopię. VERTE 

/Imię nazwisko Pacjenta, PESEL/*

<u>1 dzień</u> <u>przed</u> <u>terminem</u> <u>badania</u>	<u>Lekkostrawne śniadanie</u> np. bułka lub kromka chleba jasnego z masłem, jajkiem na twardo, plastrzem wędliny, zupa mleczna. Dowolna ilość wody, herbaty, kawy bez fusów (czarnej lub z mlekiem). Po godz. 12:00 dozwolona jest woda, herbata, kawa, można ssać landrynki, miód. <u>Nie należy pić mleka i soku oraz spożywać pokarmów stałych. Absolutnie nie wolno już spożywać żadnych pokarmów stałych.</u>	O godz. 16:00: Rozpuścić: <u>3 saszetki Fortransu (środek jest dostępny tylko na receptę!)</u> w 3 litrach niegazowanej wody (1 saszetka/litr wody) i wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut. 4- tą saszetkę Fortransu rozpuścić w dniu badania około godziny 5 rano i pić w tempie szklanka co 15 minut.
<u>W dniu</u> <u>badania</u>	BARDZO WAŻNE! Jeśli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe musisz skonsultować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia indywidualnego harmonogramu odstawienia leków przeciwzakrzepowych. Leki przeciwplatekcyjne np. Polocard, Plavix odstawienie zazwyczaj 2-5 dni przed badaniem. IŁOŚĆ DNI USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB KIERUJĄCY NA BADANIA! DOUSNE ANTYKOAGULANTY np. Warfin, Acenokumarol(Sintrom) ostawia się zazwyczaj 3 dni przed badaniem i trzeba koniecznie oznaczyć poziom INR z krwi, który musi wynosić w dniu badania poniżej 1,5. XSARELTO, PRADAXA, ELIQUIS ostaw na 48 godzin przed badaniem, przy problemach z nerkami na 72 godziny przed planowaną kolonoskopią. Osoby , które regularnie przyjmują leki nasercowe, na nadciśnienie tętnicze , przeciwpadaczkowe zażywają poranną dawkę. <u>Do czasu badania</u> <u>nie spożywać pokarmów i nie pić płynów.</u>	Na powrót do domu po badaniu należy zapewnić sobie opiekę osoby towarzyszącej.