

13 43 07 995 sekretariat Pracowni Endoskopii w godz. 10:00 -12:00

13 43 09 663 lub 508 347 282 pracownia endoskopii

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

W trosce o Państwa czas i spokój prosimy o zapoznanie się z formularzem zgody na kolonoskopię przed zaplanowanym terminem badania.

Treść dokumentu proszę odczytać w dowolnym momencie w domu po zeskanowaniu kodu QR:

Zeskanuj mnie!

Jednocześnie informujemy, że przed wejściem do pracowni w dniu badania, należy zgłosić się 5 minut wcześniej przed planowaną godziną badania do sekretariatu pracowni z dowodem osobistym celem podpisania wymaganej zgody na badanie.

Bez dopełnienia tej formalności wejście do pracowni nie będzie możliwe.

TERMIN BADANIA:	Dieta	Zastosowanie leków przeczyszczających
5 dni przed terminem badania	**Nie spożywać:** ○ Warzyw i owoców pestkowych (np. kiwi, maliny, winogrona, pomidory, ogórki) ○ ziaren (siemię lniane, mak itp.) ○ Ciemnego pieczywa ○ buraków ○ napojów gazowanych **Zalecane: Dieta półpłynna:** ❖ Ryż, makaron, chleb biały lub kajzerki, kleik, gotowane mięso i ryby, jajka gotowane, napoje niegazowane, herbata, kawa, woda.	**Osoby z zaparciami** – kupić (dostępny bez recepty) syrop **LACTULOZA** – pić 3x1 łyżka Pacjent powinien przejść na płynną, lekkostrawną dietę. VERTE

1 dzień przed terminem badania	**Lekkostrawne śniadanie** np. bułka lub kromka chleba białego z masłem, z serem, jajkiem na twardo, plastrem wędliny, zupa mleczna. Dowolna ilość wody, herbaty, kawy bez fusów (czarnej lub z mlekiem). **Po godz. 12:00** dozwolona jest woda, herbata, kawa, można ssać landrynki, miód. ✖ **Nie należy pić mleka i nieklarowanego soku. Po spożyciu fortransu do czasu badania nie wolno spożywać pokarmów stałych!**	**O godz. 16:00:** Rozpuścić: **4 saszetki Fortransu (środek jest dostępny tylko na receptę!)** w 4 litrach niegazowanej wody (1 saszetka/litr wody) i wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut.
W dniu badania	**BARDZO WAŻNE!** **Jeśli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe musisz skonsultować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia indywidualnego harmonogramu odstawienia leków przeciwzakrzepowych.** **Leki przeciwpłytkowe np. Polocard, Plavix odstawienie zazwyczaj 2-5 dni przed badaniem. ILOŚĆ DNI USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB KIERUJĄCY NA BADANIA!** **DOUSNE ANTYKOAGULANTY np. Warfin, Acenokumarol(Sintrom) ostawia się zazwyczaj 3 dni przed badaniem i trzeba koniecznie oznaczyć poziom INR z krwi, który musi wynosić w dniu badania poniżej 1,5.** **XSARELTO, PRADAXA, ELIQUIS ostaw na 48 godzin przed badaniem, przy problemach z nerkami na 72 godziny przed planowaną kolonoskopią.** **Osoby , które regularnie przyjmują leki nasercowe, na nadciśnienie tętnicze , przeciwpadaczkowe zażywają poranną dawkę.** ✖ **Do czasu badania nie spożywaj pokarmów i nie pij płynów.**	**W DNIU BADANIA PO ZABIEGU PACJENT NIE MOŻE PROWADZIĆ SAMODZIELNIE SAMOCHODU !!!** **NA BADANIU W ZNIECZULENIU OGÓLNYM KONIECZNA JEST OBECNOŚĆ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ PACJENTOWI OD POCZĄTKU TRWANIA ZABIEGU W PRACOWNI AŻ DO MOMENTU PRZEKAZANIA POD OPIEKĘ DO DOMU!!!**